

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-10-69 979623

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17 - 9.57

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Agglo. de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K.

25 F.

Supplément n° 1 au Bulletin n° 109 - OCTOBRE 1969 -

27 OCTOBRE 1969

TRAITEMENT D'AUTOMNE DES ARBRES FRUITIERS

Les traitements appliqués à cette époque de l'année visent à protéger les arbres contre un certain nombre de maladies graves dont la pénétration est facilitée par les nombreuses cicatrices laissées par la chute des feuilles.

CORYNEUM OU CRIBLURE DES ARBRES A NOYAUX : Responsable sur feuilles de petites taches brunes violacées dont rapidement la partie centrale se détache du limbe qui paraît criblé ; un certain nombre de jeunes pousses et de bouquets sont également détruits.

Des pulvérisations cupriques à la dose de 500 grammes de cuivre métal/hectolitre de bouillie sont préconisées lorsque 50 % des feuilles sont tombées.

CIOQUE DU PECHER : Les mêmes pulvérisations sont efficaces contre cette maladie.

MALADIE BACTERIENNE DU CERISIER : Elle provoque des lésions chancreuses avec suintements et écoulements de gomme sur les troncs et les rameaux. Deux traitements cupriques sont nécessaires, l'un au début de la chute des feuilles, à raison de 250 grammes de cuivre, l'autre lorsque la chute est complète, avec une dose double de cuivre soit 500 grammes.

CHANCRE DU POMMIER : Caractérisé par de petites taches ovalaires, nécrosées, qui évoluent lentement en creusant profondément le pourtour du rameau amenant la mort de la branche atteinte. C'est une maladie commune dans les vergers établis en sol humide ou dans les plantations trop denses.

L'emploi des bouillies cupriques est également recommandé : un premier traitement est conseillé à la dose de 500 grammes de cuivre, lorsque les arbres ont perdu les trois quarts de leurs feuilles, en insistant particulièrement sur les brindilles, rameaux et charpentières. Dans les vergers très contaminés, renouveler la pulvérisation après chute totale du feuillage.

Il est avantageux de compléter ces traitements par l'éradication à la taille des parties chancreuses et de recouvrir, après nettoyage, les plaies provoquées par l'excision des chancres restants.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur
de la Protection des Végétaux - Circonscription
phytosanitaire "BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE" :

H. SOULIE.

Imprimerie de la Station "Bourgogne et Franche-Comté"

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.

P2 80